AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 30-5-83177881

Publication périodique de la Circonscription PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR, CORSE

- MINISTERE DE L'AGRICULTURE - - SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX -
STATION D'AVERTISSEMENTS : Ancienne Conserverie de CASAMOZZA, LUCCIANA 20290 - BORGO
Abonnement annuel : 65 Fr. à Régisseur recettes de D.D.A. VAUCLUSE - Marseille 9660 74 V



Edition Speciale Corse

BULLETIN N° 7 DU 26 Mai 1983.

VIGNE

• MILDIOU

Des foyers ont été découverts à AGHIONE, MAISON PIERAGGI et au Nord d'ALERIA. Dans les autres vignobles, aucun foyer n'a été signalé. Compte tenu des pluies récentes, un premier traitement est toutefois à réaliser avant le début de la floraison, soit avant la fin de la semaine prochaine, afin d'assurer une protection préventive des grappes. Ces grappes deviennent, à ce moment-là, très sensibles aux attaques de Mildiou.

• OIDIUM

Cette maladie reste virulente et les attaques sur grappes sont déjà visibles. Un poudrage en pleine floraison est à réaliser impérativement en toutes zones.

• TORDEUSE de la GRAPPE

Le vol de Iere génération est terminé. Les premiers glomérules sont déjà visibles. Nous rappelons qu'une application d'insecticide curatif n'est justifiée que si on observe 200 glomérules pour 100 grappes en moyenne. D'après les observations, une intervention ne se justifie pas dans les vignobles de PATRIMONIO, du CAP, BALAGNE, MARANA-CASINCA, jusqu'à BRAVONE, ainsi que les coteaux d'AJACCIO, les vignobles de SARTENE et PORTO-VECCHIO.


Ailleurs, bien dénombrer les glomérules avant d'envisager un traitement curatif.

P9

... / ...

Imprimerie de la STATION de CASAMOZZA - Directeur gérant Pierre DUFFAUD - CPPAP n° 1769 A-D

. CICADELLES VERTES



On les observe à la face inférieure des feuilles. Elles sont de couleur verdâtre et s'envolent si on secoue le feuillage.

Intervenir si le seuil de 100 larves sur 100 feuilles observées est dépassé.

ARBRES FRUITIERS

. CARPOCAPSE des POMMES et TORDEUSE ORIENTALE du PECHER

Les captures en pièges sexuels sont très faibles à nulles. Ne pas intervenir pour le moment.

. OIDIUM du POMMIER

Maintenir la protection.

CULTURES MARAICHERES

. MILDIOU de la Pomme de Terre, de la Tomate et de l'oignon

Des dégats sont observés en MARANA, compte tenu des conditions climatiques. Maintenir la protection.

. PUCERONS sur MELONS, AUBERGINES et POIVRONS

Les attaques sont nombreuses. Utiliser un aphicide spécifique.